

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR**CANON****BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL**

Composición	(% p/p)
Fósforo (P ₂ O ₅)	40,0
Potasio (K ₂ O)	20,0

Metales Pesados:	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1,0	<0,7	<1,0	<5,0

CANON, concentrado soluble (SL).

Fertilizante líquido de alta calidad recomendado para suplir deficiencias de fósforo (en forma de anión fosfito) y potasio en cultivos hortícolas, frutales y ornamentales.

CANON, además, activa los mecanismos naturales de defensa a enfermedades de la planta por inducir la producción de fitoalexinas. Como sus componentes son esenciales para las proteínas, favorece el desarrollo vegetativo de la planta, el desarrollo radicular y la formación de semillas.

INSTRUCCIONES DE USO*:

Use **CANON** cuando las plantas muestren carencia de los nutrientes presentes en esta formulación (PO₃³⁻ y K⁺). La frecuencia con la que se debe utilizar el producto es de acuerdo a los requerimientos y tipo de cultivo. La última aplicación debe realizarse tres semanas antes de la cosecha.

Cultivos	Dosis cc / 100 L	Aplicaciones foliares*
Pepino, Melón, Sandía, Zapallo	150 a 200	Aplicar en almácigo con un par de hojas verdaderas, repetir luego del trasplante y cada 7 a 10 días.
Cebolla, Ajo	200 a 250	Realizar las aplicaciones durante todo el periodo vegetativo, cada 7 a 10 días.
Tomate, Pimiento, Papa	200 a 250	Luego del trasplante o siembra, y repetir cada 7 a 10 días durante todo el periodo vegetativo.
Lechuga, Repollo, Coliflor, Brocoli	150 a 200	Luego del trasplante o siembra, y repetir cada 7 a 10 días durante todo el periodo vegetativo.
Tabaco	150 a 200	Luego del trasplante y repetir cada 7 a 10 días.
Limonero, Naranja, Mandarino	150 a 200	Al inicio de la época de lluvias, repitiendo cada 20 días.
Palto	100 a 150	Aplicar desde inicios de brotación cada 30 días completando 5 a 6 aplicaciones.
Peral, Manzano	150 a 200	Desde brotación 3 aplicaciones cada 30 días.
Vid de mesa y vinífera	200 a 250	Aplicar desde inicios de brotación 4 aplicaciones cada 20 días.
Arándano, Frambuesa, Mora y Frutilla	200 a 250	Desde inicios de brotación 4 aplicaciones cada 20 días.
Nogal	150 a 200	Desde endurecimiento de cáscara 3 aplicaciones cada 20 días.
Duraznero, Nectarino, Cerezo, Ciruelo	200 a 250	Desde fruto cuajado 3 aplicaciones cada 20 días.

*Ante situaciones de estrés, en hortalizas, mezclar con 300cc/100L de **RUKAM® Imw**.

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

CANON

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

DOSIS VÍA RIEGO: 2 a 4 L/ ha. Elegir la dosis en base a las características del suelo del cultivo.

MODO DE EMPLEO:

Agitar el envase antes de abrir. El volumen de agua dependerá del equipo utilizado, es importante realizar un buen cubrimiento del follaje. En un tanque poner la mitad de agua completamente limpia, luego poner la dosis recomendada de **CANON**. Completar con agua, agitar permanentemente y aplicar. Antes de colocar el producto en la bomba, ésta debe estar calibrada para que la aspersión del producto sea eficiente.

PRECAUCIONES:

- No tratar cuando la planta se encuentre en situación de estrés o en condiciones climáticas extremas de calor o frío. En este caso aplique **RUKAM® Imw** hasta recuperación.
- No almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, ropa o forraje.
- Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de etiqueta, en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente, protegido de heladas.
- Evítese la contaminación de fuentes de agua.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos cúpricos, aceites, dimetoato y dicofol. Si se ha aplicado un producto en base a cobre o aceite, esperar un mes para la aplicación de **CANON**. Se recomienda realizar previamente pruebas preliminares de compatibilidad..

Fabricado por:



Luxembourg Industries Ltd.
27 Hamered St.,
Tel-Aviv 6812509
Israel

®: Marca registrada de **MABRUK**

MABRUK®
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
www.mabruk.cl
FONO: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO