

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR**CANON PRO**

CANON PRO es un fertilizante granulado de óptima calidad recomendado para suplir deficiencias de fósforo y potasio en cultivos hortícolas y frutales.

CANON PRO su exclusiva formulación granulada facilita:

- Su almacenamiento, transporte y manipulación.
- La dosificación, con menores pérdidas y riesgos.
- La recolección y limpieza ante posibles derrames.

Composición (% p/p)

Fósforo (P ₂ O ₅)	54
Potasio (K ₂ O)	36

Metales Pesados:	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0

pH (0.1%) 5.6

Tensión superf. 58dyn/cm

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Dosis* (Kg/ha)		Aplicaciones
	Foliar	Riego*	
Pepino, Melón, Sandía, Zapallo	0,5 a 1	1,5 a 2	Aplicar en almácigo con un par de hojas verdaderas, repetir luego del trasplante y cada 7 a 10 días.
Cebolla, Ajo	0,7 a 1	2 a 3	Realizar las aplicaciones durante todo el periodo vegetativo, cada 7 a 10 días.
Tomate, Pimiento, Papa	0,7 a 1	2 a 3	Luego del trasplante o siembra, y repetir cada 7 a 10 días durante todo el periodo vegetativo.
Lechuga, Repollo, Coliflor, Brócoli	0,5 a 1	1,5 a 2	Luego del trasplante o siembra, y repetir cada 7 a 10 días durante todo el periodo vegetativo.
Tabaco	0,5 a 1	1,5 a 2	Luego del transplante y repetir cada 7 a 10 días.

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción

*Elegir la dosis en base a las características del suelo y el desarrollo radicular.

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR**CANON PRO****RECOMENDACIONES DE USO**

Frutales	Dosis*		Aplicaciones
	(g/100L)	(Kg/ha)	
Peral, Manzano	80 a 100	4 a 5	A partir brotación 3 aplicaciones cada 30 días.
Vid de mesa y vinífera	100 a 125	3 a 4	Desde inicios de brotación 4 aplicaciones cada 20 días.
Duraznero, Nectarino, Cerezo, Ciruelo, Nogal	100 a 125	3 a 4	Desde fruto cuajado 3 aplicaciones cada 20 días.
Cítricos	100 a 125	4 a 5	Al inicio de la época de lluvias, repitiendo cada 20 días. Realizar la última aplicación 3 semanas antes de cosecha.
Palto	60 a 80	5 a 7	Desde inicios de brotación cada 30 días completando 5 a 6 aplicaciones.
Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla	100 a 125	2 a 3	Desde inicios de brotación 4 aplicaciones cada 20 días
Nogal	100 a 125	5 a 6	Desde endurecimiento de cáscara 3 aplicaciones cada 20 días.

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción

No tratar cuando la planta se encuentre en situación de estrés por condiciones climáticas extremas, efecto de aplicación de plaguicidas. En este caso aplique **RUKAM® Imw** (sin mezclarlos) hasta recuperación.

No mezclar con productos cúpricos, aceites, fertilizantes nitrogenados, dimetoato y dicofol. Si se ha aplicado un producto en base a cobre o aceite, esperar un mes antes de la aplicación de CANON PRO. Antes de mezclar con otros productos se recomienda realizar previamente pruebas preliminares de compatibilidad

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Marcas registradas de

MABRUK®
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

www.mabruk.cl

agosto 2019