

**CORRECTOR DE CARENCIAS****FOLIAR – K**

| <b>Composición</b>                       | (%p/v) |
|--|--------|
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 49,2   |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 1,8    |

| Metales Pesados: | As    | Cd    | Hg    | Pb    |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| ppm              | < 1,0 | < 0,7 | < 0,5 | < 5,0 |

**ALTA CONCENTRACIÓN DE POTASIO**

**FOLIAR – K** incorpora una alta concentración del catión potasio al tejido vegetal en forma rápida.

**FOLIAR – K** al contener una alta concentración de potasio puede ser utilizado para prevenir y curar estados carenciales debido a deficiencias o desequilibrios en la asimilación del potasio. El fósforo mejora la asimilación y disponibilidad del catión.

El suministro de potasio asimilable en concentraciones adecuadas, es fundamental para inducir la coloración de frutos y favorecer la síntesis y acumulación de azúcares en los órganos de reserva.

**INSTRUCCIONES DE USO**

El diagnóstico en terreno, respaldado por los análisis foliar y/o de suelo, son la base para establecer las necesidades nutricionales de la plantación o cultivo.

| <b>Cultivos</b>  | <b>Dosis* (L/ha)</b> | <b>Aplicaciones foliares</b>   |
|--|----------------------|--|
| Duraznero, Nectarino, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Almendro | 2 - 3                | Aplicar 3 a 4 veces, desde caída de pétalos.   |
| Vid de mesa y vinífera.                                  | 2 - 3                | 3 a 4 aplicaciones foliares desde inicio de brotación. En variedades de color, desde cierre de racimo en adelante. |
| Manzano, Peral   | 3 - 4                | 3 a 4 aplicaciones cada 15 días desde caída de pétalos.  |
| Cítricos, Palto  | 3 - 4                | Aplicaciones foliares desde fruto cuajado, repetir cada 15-20 días.  |
| Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla                      | 1– 2                 | Aplicaciones desde fruto cuajado, cada 10-15 días.   |
| Acelga, Espinaca, Lechuga, Coliflor, Brócoli             | 2 - 3                | 2 a 3 aplicaciones desde un mes después del trasplante.  |
| Melón, Sandía, Zapallo                                   | 1 – 2                | 3 a 4 aplicaciones desde fruto cuajado.  |
| Tomate, Pimiento, Pepino                                 | 1 – 2                | Aplicaciones desde fruto formado, repitiendo cada 10-15 días.  |
| Ajo, Cebolla   | 1 - 2                | 2 a 3 aplicaciones desde un mes antes de cosecha.  |
| Papa, Camote   | 2 - 3                | 2 a 3 aplicaciones 30 días después de emergencia.  |

**Vía riego:** en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible por las características del relieve, aplicar vía riego a la dosis de **4 a 6 L / ha** en cada aplicación.

\*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción

**CORRECTOR DE CARENCIAS****FOLIAR – K****PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Agitar el envase de **FOLIAR – K**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

**PRECAUCIONES**

**FOLIAR – K** puede producir irritación en los ojos y la piel, por lo que en su aplicación se recomienda utilizar guantes impermeables y antiparras. Mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar; almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso.

Al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

**COMPATIBILIDAD**

**FOLIAR – K** es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM®**. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con aceites minerales, sulfatos ni productos de reacción acida.

Producto de:

**MABRUK®**  
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.  
FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774

**LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**