

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

**RUKAM<sup>®</sup> Calcio**

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

**Máxima eficiencia en el suministro del ión Calcio  
en condiciones de alta exigencia productiva**

**RUKAM<sup>®</sup> Calcio** incorpora el ion  $Ca^{++}$  complejoado con aminoácidos facilitando su absorción y transporte, lo que permite una rápida corrección de las deficiencias. Asegura la incorporación del calcio en condiciones de estrés por la acción de los aminoácidos

**RUKAM<sup>®</sup> Calcio** influye en la condición de la fruta, otorgándole una mayor firmeza y resistencia a la degradación enzimática (maduración, desgrane, hair line) y al efecto de patógenos.

**RUKAM<sup>®</sup> Calcio** aplicado entre cuaja y cosecha permite mejorar la vida de post-cosecha de frutas y hortalizas.

**RUKAM<sup>®</sup> Calcio** ayuda en la prevención de fisiopatías y otras alteraciones originadas por baja concentración de  $Ca^{2+}$  en el citoplasma.

**Composición** (%p/v)

Aminoácidos	8.5
Calcio (CaO)	12.4
Boro	0.7

Metales Pesados	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1,0	<0,7	<0,5	<5,0

pH sol.10%: **5.49** - Densidad: **1.24** g/ml**RECOMENDACIONES DE USO:**

Frutales y vides	Dosis*		Aplicaciones Foliares
	L/ha		
Manzano y Peral	3 - 4		Aplicar desde fruto recién cuajado cada 10 a 15 días.
Kiwi	2 - 4		3 aplicaciones desde fruto recién cuajado cada 10 a 12 días.
Duraznero, Damasco, Almendro.	3 - 4		3 a 4 aplicaciones a partir de fruto cuajado hasta pre-cosecha.
Cerezos, Guindo.	4 - 5		3 a 4 aplicaciones, desde 3 semanas antes de cosecha.
Palto y Cítricos	3 - 4		2 a 3 aplicaciones cada 10 a 15 días, a partir de frutos de 2 a 3
Arándano.	2 - 3		2 a 3 aplicaciones cada 10 a 15 días, a partir de fruto cuajado
Uva de mesa.	2 - 3		1 a 2 aplicaciones desde brotes de 20 a 30 cm hasta pinta y 2 a 4 con las de crecimiento ( $GA_3$ ).
Vid vinífera.	2 - 3		2 a 3 aplicaciones cada 7 días a partir de baya de 4 a 5 mm.

\*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.

Todas las recomendaciones indicadas son una referencia. La necesidad de las aplicaciones, dosis y periodicidad dependen del diagnóstico en terreno, respaldado por el análisis foliar.

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

**RUKAM<sup>®</sup> Calcio**

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

Hortalizas y Flores	cc/100L	Aplicaciones Foliare
Lechuga, Apio y Repollo	0,5 - 1	Iniciar aplicaciones después del trasplante y repetir cada 10 a 20 días.
Coliflor y Brócoli	0,5 - 1	Aplicar desde la 6ª hoja. Repetir cada 10 días.
Tomate, Berenjena, Ají, Pepino y Pimentón	1,0 - 1.2	Una aplicación post-trasplante y repetir con nuevos frutos cuajados, cada 7 a 10 días.
Melón y Sandía	0,8 - 1	Iniciar las aplicaciones desde pre-floración. Repetir cada 10 días.
Almácigos	0.5 - 0.8	Una aplicación, 7 días antes del trasplante.
Flores de agua	1 cc/L	En situaciones de estrés (falta de luz, heladas, salinidad ).

**Vía riego:** Cuando no sea posible la aplicación foliar aplicar de 6 - 10 L / ha.

\*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.

**COMPATIBILIDAD**

**RUKAM<sup>®</sup> Calcio** es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM<sup>®</sup>**, salvo Rukam Cu. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.

**PRECAUCIONES**

Los productos **RUKAM<sup>®</sup>** son de origen natural, prácticamente no tóxicos, no obstante en su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar; almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso. **RUKAM<sup>®</sup> Calcio** al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Agitar el envase de **RUKAM<sup>®</sup> Calcio**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Marcas registradas de

**MABRUK<sup>®</sup>**  
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

[www.mabruk.cl](http://www.mabruk.cl)