

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR**RUKAM[®] Zinc****BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL**

Composición	(% p/v)
Aminoácidos	16
Zinc	6,7

Metales Pesados:	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1,0	<0,7	<0,5	<45

RUKAM[®] Zinc, concentrado soluble (SL).

Suministra a nivel celular el zinc complejado con aminoácidos y péptidos de bajo peso molecular, incorporándose directamente al circuito metabólico.

Estimula las funciones biológicas, el sistema hormonal y enzimático, acelerando la respuesta a los factores de estrés que los afecten, tanto climáticos, biológicos como químicos.

Participa en la síntesis de triptófano precursor de las auxinas. Favorece la cuaja, proceso en el que actúa promoviendo la elongación del tubo polínico a través del estilo floral.

Se usa como corrector de carencias.

INSTRUCCIONES DE USO:

Integrar el producto al programa de tratamientos cuando se requiera una rápida entrega del catión a nivel celular.

En especial se recomienda la mezcla con **RUKAM[®] Boro** para promover la germinación del polen y la elongación del tubo polínico.

Cultivos	Dosis* L/ha	Aplicaciones foliares
Vid de mesa y vinífera	1,5 - 2	En brotación 1 a 2 aplicaciones con brote de 30 a 40 cm y brote de 60 a 80 cm. 1 a 2 aplicaciones 10-15 días antes de inicio de flor.
Duraznero, Nectarino, Guindo, Damasco, Ciruelo, Cerezo, Almondro	2 - 3 3 - 4	Una aplicación a inicio de floración. En postcosecha con follaje activo.
Manzano, Peral	2 - 3 3 - 4	Una aplicación entre puntas verdes y ramillete floral. En postcosecha con follaje activo.
Palto, Cítricos	2 - 4	2 aplicaciones a partir de inicio del flujo vegetativo en primavera y según análisis foliar repetir a fines de verano.
Nogales	1 - 2	Según necesidad del cultivo.
Berries	1 - 2	1 a 2 aplicaciones antes de floración.
Maiz	2 - 3	Aplicar de 4 ^a a 6 ^a hoja.
Hortalizas	0,5 - 1,5	1 a 3 aplicaciones desde 10 días post-trasplante

Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible por las características del relieve, aplicar vía riego a la dosis de **4 a 6 L / ha** en cada aplicación. En flores 0,8 cc/L de agua en cada aplicación.

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

RUKAM[®] Zinc

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agitar el envase de **RUKAM[®] Zinc**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

PRECAUCIONES:

Los productos **RUKAM[®]** son de origen natural, prácticamente no tóxicos, no obstante en su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar; almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso.

RUKAM[®] Zinc al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

RUKAM[®] Zinc es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM[®]**. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.

©: Marca registrada de **MABRUK**

MABRUK[®]
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO